



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה  
דו"ח מטה הדברה, מיום 29 ביוני 2011



**מוצצים** - מעט מאוד אקריות וכנימות עלה. גם רמת הציקדות ירדה לעומת השבוע שעבר.

**כע"ט** - מתחילים לראות בוגרים בשדות והתחלת התבססות. **משקים שמתכוונים ליישם קונפידור חייבים להקפיד על מגבלות הרישוי. מומלץ להשאיר, לפחות שישייה אחת ללא החומר, כדי לבחון את הצורך ביישום המוקדם של התכשיר!**

**הליותים** - המזיק הופיע השנה ברוב האזורים בעוצמה רבה. נמשכות הטלות מסיביות, שמתבטאות בחלק מהאזורים ברמה גבוהה של זחלים עד כדי צורך בריסוס שלישי. לפי מדיניות הדברה נעבר, לקראת אמצע יולי, לריסוס בפירתרואידים להדברת המזיק. בחוברת "נהלים לגידול כותנה" המלצנו להוריד את הסף לריסוס לזחל אחד למטר שבועיים מפריחה. הנימוק להורדת הסף היה התחלה של פיתוח עמידות לתיונקס. השנה אנו רואים שתוצאות ההדברה עם תיונקס טובות, ברוב המקרים, וכיוון שהצמחים מלאים בכפתורים שלא כולם יחנטו, אנו ממליצים **לא לשנות** את הסף ולהשאר עם **סף לריסוס של מציאת שני זחלים גדולים מ-3 מ"מ למטר שורה**. מהטבלה "מזיקים וחלפת, סיפי פעולה, תכשירים ומינונים בחוברת "נהלים לגידול כותנה" (עמ' 62), במידע לגבי ההליותים ניתן להבין שאנו ממליצים לרסס בכל שלב של המזיק בתכשיר אחר. זו טעות. בגלל עלות הריסוס הגבוהה לדונם עדיף להשתמש בתכשירים אוונט וספרטה רק במקרה של כשלון בהדברה עם תיונקס.

**ז.ורוד** - במספר שדות, בעיקר בדרום, מוצאים רוזטות. **מומלץ לטפל פעמיים, בהפרש של שבוע אם מגיעים לסף, שהוא – מציאה של זחלים חיים ב-5% מהפרחים**. בשדות שבהם יש הלקטים בני שבועיים-שלושה צריך להתחיל בבדיקת ההלקטים לנוכחות ביצים/בקיעות וזחלים. רצוי לאסוף רוזטות ולשים אותן בקופסא כדי לעקוב אחרי מועד גיחת הבוגרים. נתון זה יכול לעזור בקביעת מועד ההתחלה של הדור השני בשדה.

**זיפית** - זחלים בודדים.

**חלפת** - כמעט שלא נצפתה נגיעות במחלה.

**מצב השדות** - צבירה נמוכה של ימי מעלה, בעיקר בחלקים הצפוניים של הארץ, הביאה לאחור של שבוע עד עשרה ימים בפריחה. יש לשמור על קצב צימוח גבוה של כ-1.5-2 ס"מ ליום ולהעלות את כמויות המים בהתאם לגובה הצמחים ולמועד הפריחה.

בברכה,

עופר גורן ואריאלה ניב