

המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 4610302 P.O.Box: 384, Herzlia B'
טל': 09-9604000 (רב-קווי), פקס: 09-9604030 09-9604003, Fax: 972-9-9604003, Tel:

17.2.21

למגדלים, מדריכים ופקחים שלום,

עונת הכותנה מתקרבת ואנחנו נערכים לעונת הדרכת ההדברה. העונה, בעקבות השינויים שהיו במועצה, מתניה ואני נעמוד לרשותכם. ימי ההדרכה יקבעו אל מול הפקחים, וכמובן שאנחנו זמינים לכל שאלה.

אנחנו זמינים עבורכם בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בנוסף, בחישוב של צבירת ימי המעלה להלקטית ורודה, העונה אנחנו רואים צבירה מהירה מאוד של ימי מעלה להתחלת הגיחות של ההלקטית הורודה. אם ימשכו הימים החמים אנו צפויים לראות הקדמה של הגיחות האביביות של העשים והרבה "גיחות התאבדות".

אפשר להתעדכן באתר המועצה לגבי המשך צבירת ימי המעלה לקראת הזריעות.

השנה צבירת ימי המעלה מהירה לעומת השנה שעברה בכל האזורים:

אחוז מ-2020	2020	2021	
333	39	131	אפק
257	37	96	יזרעאל
317	39	125	גן שומרון
313	42	131	המעפיל
321	42	134	רבדים
	68	109	שדה יואב (קרית גת)
275	46	127	קבוצת יבנה
183	67	123	גברעם

התחלת הגיחות הינה לאחר צבירה של 270 ימי מעלה.

בברכה,

מיכל אקסלרוד


אנטומולוגית מועצת הכותנה

המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 4610302 P.O.Box: 384, Herzlia B'
טל': 09-9604000 (רב-קווי), פקס: 09-9604030 09-9604003, Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010

טמפרטורת הסביבה משפיעה על ההתפתחות של אורגניזמים אשר אינם מווסתים את החום הפנימי, כמו צמחים ומזיקיהם. כמות החום הנדרשת על ידי אורגניזם להשלמת ההתפתחות ידועה כזמן פיזיולוגי, אשר מבוטא בד"כ ביחידות הנקראות ימי מעלה. ימי מעלה מכמתים את הסביבה התרמית של אותם אורגניזמים ומשמשים במעקב אחר התפתחותם הפנולוגית. לכל אורגניזם ישנו טווח טמפרטורות אשר מתאים להתפתחות. הסף התחתון הינו הטמפ' המינימאלית שבה ההתפתחות נעצרת ואילו הסף העליון הוא הטמפ' שמעליה ההתפתחות נעצרת, או קצב ההתפתחות יורד. השימוש בימי מעלה עשוי לעזור בניהול מערכות חקלאיות שונות בכך שהוא מאפשר לחזות את מועד התרחשותם של אירועים ביולוגיים משמעותיים. בגרף המצורף מוצג מהלך צבירת ימי המעלה באזורים שונים בארץ. צבירת ימי המעלה בעבור ההלקטית הורודה נעשית מה-1 בינואר על פי סף התפתחות תחתון 12.8 מ"צ ועליון 30 מ"צ.



נתונים אלו נועדו לעזור ולחשב את אחוז גיחות ההתאבדות הצפוי של ההלקטית הורודה ולהסיק את רמת החשיפה של כל אזור למזיק. על מנת להסיק את רמת החשיפה יש להיעזר בחוברת הנהלים לגידול כותנה

2014-2015, ע"מ 28-29.