



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה  
דו"ח מטה הדברה, מיום 10 בספטמבר 2008

**מוצאים** - מעט מאוד כנימות עלה.

**כע"ט** - ירידה בבוגרים ובזחלים לעומת השבוע שעבר. בשדות בהם רואים עלייה בבוגרים עדיף להקדים את השילוכים.

**הליותים** - רואים נוכחות של זחלים בודדים.

**ז.ורוד** - ממשיכה העלייה בנגיעות ובלכידות. בשדות נגועים כדאי להוסיף פירתרואיד או סופרתיון לשילוך הראשון.

**זיפית** - מוצאים זחלים בודדים. בכותנה אורגנית מאוחרת רואים עלייה ברמת הזחלים.

**השבוע רוסו פחות מ-20% משטחי המדגם. כל הריסוסים היו נגד זחל ורוד.**

## **דחיית הקטיף בשדות המוכנים עלולה להסב נזקים.**

ההנחיות הבאות נועדו להפחית את שאריות הכותנה בשדות, באזורי הערמות, בצידי הדרכים, במנפטות - הכל כדי להקטין את האוכלוסייה של המזיק אשר תכנס לתרדמה ותהווה מקור להתפתחות אוכלוסיות המזיק בעונה הבאה.

**בשדה, בתקופת הקטיף**- קטיף עם פחת מינימלי.

קטיף שני בשדות בהם התפתחה אוכלוסיה גבוהה של זחל ורוד  
איסוף הכותנה שנופלת ליד המהדקים.

**בשדה לאחר הקטיף** - עקירה וקיצוץ של הכותנה עד דק.

סילוק שאריות הכותנה מפני השדה בדרכים שונות, כגון: איסוף לאומנים  
(וואלים) יצירת חבילות, הכנסת בקר, **ומעל לכל – חריש יעיל!**

**באזור ערמות הכותנה**- איסוף שאריות הכותנה מיד לאחר הרמת ערמה אל המובר, כדי למנוע דריסה והידוק של השאריות ע"י המובר בהעמסה הבאה.

שריפת שאריות הכותן מיד לאחר פינוי הערימות.

הוצאה מוקדמת של כותנה מאזורים בעייתיים להגעה, כך שתמנע הוצאת ערמות משטחים בוציים.

כיסוי החלק האחורי של הערמות על המובר, כדי למנוע פיזור של כותנה בצידו הדרכים בזמן ההובלה מהשדה אל המנפטה.

ניקוי של כל שאריות הכותנה מאזור המנפטה לאחר עונת הניפוט.

יש לעקור את כל הצמחים שנותרו בשוליים, ליד ברזים וכו'.

**בהובלה -**

**במנפטה -**

**ביעור צמחי ספיח -**

בברכה,

יובל ואריאלה - אגף הייצור וההדברה

עפר גורן - ממ"ר כותנה