



חוט קטן = נזק גדול

מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 10 באוגוסט 2011



מוצאים - רמה נמוכה של ציקדות. כמעט שלא רואים כנימות עלה ואקריות.

כע"ט - עלייה באוכלוסיות של הבוגרים והזחלים מביאה לריסוסים נגד המזיק. העונה מתקרבת לסיימה, ואם מתלבטים לגבי ריסוס, כדאי לזכור כי הריסוסים נגד כע"ט יעילים יותר על צמחים רעננים. בכל מקרה של התלבטות כדאי להתייעץ עם מדריך ההדברה.

הליותים - מוצאים מעט ביצים וזחלים. רוב הזחלים נקטלים ע"י חרקים מועילים.

ז.ורוד - לכידות בודדות, למעט בחלק מהשדות בדרום. נגיעות בביצים ובזחלים מוצאים, בעיקר, בדרום ובאזור גרנות. בשאר אזורי הארץ רמת המזיק ממשיכה להיות אפסית.

זיפית - רמה נמוכה.

פרודניה - בשדות בודדים מוצאים זחלים בגדלים שונים. יש לשים לב לזחלים בחלקים התחתונים של הצמחים.

חלפת - כמעט שלא מוצאים את המחלה.

מצב השדות - בימים אלה החלה פתיחת ההלקטים הראשונים בשדות שנזרעו מוקדם בעונה. עם תחילת פתיחת ההלקטים יש לרדת בהדרגה בהשקיה. יש חשיבות רבה לכונן את השדה לסיום הגידול לקראת השילוך והקטיף, תוך שימת דגש על שמירת עלווה שלמה וחיונית, ואמיר צימוח קטן בחלק העליון של הצמח עד למועד השילוך. השילוך מיושם בד"כ בין 70%-80% פתיחת הלקטים בשדה. לעיתים יש לבחון מתן פרפ עם או ללא גלייפוסט (ראונדאפ וכד') בשלב 40%-30% פתיחת הלקטים משיקולים של חוסר אחידות גדול בשדה מסוים, או משיקולי תכנון קטיף של כלל השדות.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן