



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 1 בספטמבר 2010

מוצצים - כמעט שאין כנימות עלה, ציקדות ואקריות.

כע"ט - ירידה בבוגרים ובזחלים. בשדות שבהם נראיית עלייה של בוגרים והתבססות של זחלים בשוליים ובקווי הברזים מומלץ לרסס אזורים אלה, בלבד, עם מוספילן. רצוי להתייעץ עם מדריכי ההדברה לפני הריסוסים. **ראוי להדגיש כי מספר ימים לאחר השילוח הבוגרים עוזבים את השדה, לכן אין צורך למהר ולרסס. אם מתחיל צימוח צעיר לאחר השילוח הנגיעות בבוגרים עלולה להתחדש.**

הליותיס - כמעט שאין.

ז.ורוד - ממשיכה העלייה בנגיעות בחלק מהשדות, בעיקר בדרום, עם ריסוסים בהתאם. בשאר אזורי הארץ רמת המזיק השנה נמוכה יותר מזו שבשנים הקודמות, או שהוא כלל לא נמצא. **גם כשההלקטים מתקשים חייבים להקפיד על ניטור המזיק, קרי חיפוש ביצים ובקיעות על ההלקטים, וריסוסים בהתאם, עד השילוח.** בשדות נגועים מומלץ להוסיף תכשיר לקטילת הזחל הורוד בשילוח, כדי להפחית את האוכלוסיה שתכנס לתרדמה. **התכשירים המומלצים לריסוס הם זרחנים אורגניים.**

זיפית - רמת המזיק גבוהה השנה יותר מאשר בשנים קודמות, בייחוד בשדות שלא טופלו נגד זחל ורוד. **התכשירים המומלצים להדברת המזיק הם פירתרואידים וסופרתיון/סופרציד.**

חלפת - רמת הנגיעות ממשיכה להיות נמוכה מאוד.

פרודניה - עצמת המזיק רבה השנה יותר מאשר בשנים האחרונות, ושדות רבים רוססו ומרוססים. **ההדברה במג"חים טובה.**

מצב השדות - ברוב האזורים מסתמן קצב פתיחה יחסית גבוה של ההלקטים. יש לעקוב אחרי אחוזי הפתיחה, כדי להחליט מתי לסגור את המים, ולתכנן את השילוח.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן