



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 25 ביוני 2008



מוצאים - מעט כנימות עלה. ציקדות בודדות בחלק מהשדות. אין אקריות.

כע"ט - נוכחות נמוכה של בוגרים, פה ושם מוצאים כבר זחלים, בעיקר באזור הגליל המערבי וגלבע.

הליותים - באזור הנגב מוצאים ביצים וזחלים (דו-גידול). בשאר האזורים נגיעות נמוכה.

ז.ורוד - בשדות בודדים ממשיכה לכידה אקראית של עשים. כן דווח על הופעה של רוזטות. ברוב השדות הרמה נמוכה, אך במספר שדות הגיעה רמת הרוזטות לסף לריסוס.

לכידה של עשים במלכודות הפרומון מחייבת התייחסות. **אם מוצאים 1-2 עשים למלכודת לילה, במשך שלשה לילות רצופים, יש לרסס.**

יש להתחיל לבדוק הלקטים ברגע שמוצאים בשדה הלקטים בני עשרה ימים-שבועיים. נמצאו כבר ביצים בודדות על הלקטים, וכן בקיעות זחלים.

זיפית - פה ושם מוצאים ביצים.

חלפת - בשדות בודדים רואים כתמים ראשונים. כדאי לסמן את הכתמים הראשונים ולראות אם המחלה מתפתחת. רצוי להוועץ במדריכים לפני החלטה על ריסוס.

מצב השדות –

שדות פימה מזרעית מרץ ושדות אקלפי מראשית אפריל נכנסים השבוע לשיא השקייה. בשלב זה רגישות הצמח גבוהה לעקות מים. לכן, במידת הצורך בריסון הצימוח יש לשקול שימוש במוסטי צמיחה. המינון יכתב מקצב הצימוח היומי.

בברכה,

יובל ואריאלה - אגף הייצור וההדברה

עפר- ממ"ר כותנה