



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה דו"ח מטה הדברה, מיום 15 באוגוסט 2007

גם השבוע הובילו הזחל הורוד וכנימת עש הטבק את מהלכי ההדברה. לפי "מדיניות ההדברה", אנו עוברים לריסוס במוספילן נגד כנימת עש הטבק



- מוצצים** - הטיפולים בפגסוס הפחיתו את בעיית כנימות העלה והציקדות, אך עדיין יש נוכחות, בעיקר של ציקדות.
- כע"ט** - השבוע נכנסו שדות נוספים לטיפול נגד המזיק. תוצאות ההדברה בשדות בהם רוסס פגסוס/בוננזה היו, בדרך כלל, טובות. תזכורת: יש לבצע ספירת זחלים מסודרת (דרגה 2 ומעלה) על עלים 5-7). לפי "מדיניות ההדברה" אנו עוברים לריסוס במוספילן נגד כע"ט, וזאת כדי לא לחשוף דור נוסף של הכנימה לפגסוס/בוננזה, ולהאיץ בכך פיתוח עמידות נגד התכשיר. עזרו לנו לשמור על הפגסוס/פגסוס, כדי שנוכל להשתמש בו, בהצלחה, גם בשנים הבאות.
- הליותים** - מזיק זה נוכח רק בשדות בודדים. במקומות בהם הוא ממשיך לטפטף יש להשתמש בפירתרואידים.
- פרודניה** - יש נגיעות במזיק בגליל העליון. בשאר השדות רמתו נמוכה.
- ז.ורוד** - ממשיך להוביל את מהלכי ההדברה גם השבוע. ברוב המקרים נראה שהריסוסים עוצרים את הנגיעות בהצלחה, שכן לאחר מספר שבועות של נוכחות רבה של המזיק בשדות, שעורי הנגיעות בהלקטים כ-2% 3%. בעמק ישנם שדות שלא טופלו, עדיין. אנו חוזרים שוב על נוהל ניטור המזיק: יש לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים ובקיעות (ראו תמונות באתר המועצה). יש לשים דגש על חיפוש מתחת לחפים ובחריצים שבין הקשוות. על המדגם להיות בן 100 הלקטים, בקוטר 2 ס"מ לפחות, שיאספו בארבע קבוצות של 25, מארבעת רבעי השדה. את ההלקטים יש לקחת לבדיקה במקום מוצל ולהעזר בזכוכית מגדלת. חשוב להקפיד לעבוד לפי הספים המומלצים ולא להוסיף סתם פירתרואידים לכל ריסוס אחר - מחשש לשחיקתם המהירה. להזכירכם: מציאת ביצים/בקיעות ב-2% מההלקטים מהווה סף לריסוס. בנוסף, יש להקפיד על תחזוקת המלכודות המהוות כלי עזר חשוב. יש לטפל על 2-3 לכידות בשני לילות רצופים לפחות.
- זיפית** - האוכלוסיות ממשיכות להיות נמוכות.
- חלפת** - אין שינוי ברמת הנגיעות בחלפת, והיא נשארה בסה"כ נמוכה.

מצב השדות

- אקלים** - עד כה דומות הטמפרטורות בחודש אוגוסט לממוצע הרב-שנתי, ללא חריגות מיוחדות.
- פימה** - במזרעים מוקדמים של מרץ החלה פתיחת הלקטים (55-60 ימים מפרח), והגיעה ל-10-15%. בשדות המתקדמים נמצאות מנות המים בירידה מתונה. בשדות בהם קצב פתיחת ההלקטים מהיר מומלץ להחליט על הקדמה של סגירת המים וקיצור העונה, כדי לא ליצור צמרות חדשות והלקטים מיותרים שלא יגיעו לקטיף, אך ישמשו מקום להטלה של זחל ורוד.

אקלפי - שדות רבים מקדימים את הפימה בצורה משמעותית. הלקטים פתוחים ראשונים נצפו כבר לפני כשבועיים (50-55 ימים מפרח). שדות אלו נמצאים ב-30-40% פתיחה, וסגירת המים בהם קרובה, בעוד כ-10 ימים. לרוב נמוכות מנות המים באקלפי בכ-10% ממנות המים בפימה. רצוי לא למשוך את הקטיפ בשדות אלו מעבר לחודש ספטמבר, כדי לא לפגוע בטיב הסיבים.

בברכה,

אריאלה ניב, יובל שטוסר ויגאל פלש
אגף הייצור וההדברה / שה"מ